



Revista Colombiana de Anestesiología

Colombian Journal of Anesthesiology

www.revcolanest.com.co



PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

Questions and answers

Fernando Raffán-Sanabria^{a,b}

^a Anestesiólogo intensivista, Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, Bogotá, D.C., Colombia

^b Profesor, Universidad del Bosque y Universidad de los Andes, Bogotá, D.C., Colombia

- En la investigación de Tafur-Betancourt LA, Arévalo-Sánchez M y Lema-Flórez E, sobre la frecuencia de tos al momento de la extubación con remifentanil se encontró que la mejor respuesta se obtuvo con niveles plasmáticos entre:
 - 1-2 ng/ml.
 - 2-3 ng/ml.
 - 3-4 ng/ml.
 - 4-5 ng/ml.
- Al comparar la efectividad de morfina vs. fentanil vía IV en el dolor severo POP, a dosis equipotentes, en intervalos de 5 min, tiempo que se considera clínicamente relevante para la reducción del dolor severo en analgesia postoperatoria Cadavid-Puentes A et al., encontraron que:
 - No hubo diferencia significativa en la eficacia para el rescate en dolor severo entre los 2 medicamentos.
 - Hubo más incidencia estadísticamente significativa de náusea y vómito con la morfina que con el fentanil.
 - Hubo mayor diferencia estadísticamente significativa de casos de depresión respiratoria con fentanil que con morfina.
 - Hubo mayor diferencia estadísticamente significativa de prurito con morfina que con fentanil.
- En la investigación realizada por Tamariz-Cruz OJ et al. sobre los efectos de la tromboelastografía en pacientes pediátricos sometidos a circulación extracorpórea mayor de 90 min se observó una alteración estadísticamente significativa en:
 - Tiempo R.
 - Ángulo alfa.
 - Lisis 30.
 - Máxima amplitud y lisis 30.
- En el escenario de la analgesia obstétrica ¿cuál de las siguientes técnicas ha sido reportada en la literatura con la mayor frecuencia de complicaciones?:
 - Peridural.
 - Bloqueo pudendo.
 - Combinada epidural-espinal.
 - Opiáceos iv.
- La hemorragia posparto (HPP) es la causa de una de cada 4 muertes maternas. De las siguientes afirmaciones ¿cuál es la correcta respecto a definición de muerte materna? La que se presenta:
 - Durante el parto.
 - Durante la gestación.
 - Hasta 42 días después del nacimiento.
 - Todas las anteriores.
- En relación con la cefalea pospunción de la dura madre en la paciente obstétrica es cierto que:
 - Se resuelve espontáneamente en el 40% de los casos.
 - El uso de hormona adrenocorticotrópica ha demostrado recientemente ser tan efectivo como el parche epidural.
 - El bloqueo esfenopalatino transnasal utilizado en la neuralgia del nervio trigémino se ha descrito como una alternativa para su manejo.
 - Todas son ciertas.

7. Con relación a la técnica de reanimación cardiopulmonar, es cierto que:

- a) Si ésta es realizada por personal entrenado, la supervivencia se encuentra entre el 7 y el 24% de los casos reportados.
- b) Se recomienda que los médicos, en general se capaciten cada 2 años.
- c) La técnica de alta calidad incluye el logro de una completa expansión del tórax entre compresiones.
- d) Todas son ciertas.

8. ¿Cuántas compresiones, como mínimo se deben realizar en un minuto de reanimación cardiopulmonar?

- a) 100.
- b) 90.
- c) 80.
- d) 120.

9. Posteriormente a la descarga del DEA usted debería:

- a) Esperar 5 s por si la descarga eléctrica lo puede afectar al tocar al paciente.
- b) Dar compresiones torácicas inmediatamente.
- c) Verificar el pulso del paciente.
- d) Esperar a que el DEA vuelva a analizar el ritmo cardiaco.

10. Los criterios postulados por Sir Austin Bradford Hill para establecer una relación causal incluyen todo lo siguiente excepto:

- a) Fuerza de asociación.
- b) Evidencia experimental.
- c) Temporalidad.
- d) Sensibilidad.

Referencia

Raffán F. Preguntas y respuestas. Rev Colomb Anestesiología. 2017;45:1-154.

Respuestas

- 1. c.
- 2. a.
- 3. b.
- 4. c.
- 5. d.
- 6. c.
- 7. d.
- 8. a.
- 9. b.
- 10. d.